

Практика № 3
К сдаче: 19.02

1 Свойства LLL редуцированного базиса

Докажите Лемму из Лекции: пусть $\delta \in (1/2, 1)$ – параметр LLL редукции, и $\alpha = \frac{1}{\sqrt{\delta-1/4}}$. Тогда для $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ – LLL редуцированного базиса справедливо:

1. $\|\mathbf{b}_1\| \leq \alpha^{n-1} \lambda_1(L(B))$
2. $\|\mathbf{b}_1\| \leq \alpha^{\frac{n-1}{2}} \det(L(B))^{1/n}$
3. $\frac{r_{i,i}}{r_{i+1,i+1}} \leq \alpha \quad \forall i \leq n.$

А: Начнём с тривиального пункта 3: так как по условию Ловаца имеем $r_{i,i} \leq \alpha r_{i+1,i+1}$, выражаем последовательно $r_{n,n}$.

П.2: следует из двух фактов: $r_{1,1} = \|\mathbf{b}_1^*\| = \|\mathbf{b}_1\| \leq \alpha^{n-1} r_{n,n}$, и кроме этого, $\lambda_1(L) \geq \min_i r_{i,i} \geq \min_i \alpha^{-i+1} r_{1,1} = r_{1,1} \alpha^{-n+1} = \|\mathbf{b}_1\| \alpha^{-n+1}$.

П.1 следует из $\det L(B) = \prod_{i=1}^n r_{i,i} \geq \prod_{i=1}^n (\alpha^{-i+1} r_{1,1}) = \|\mathbf{b}_1\|^n \alpha^{(-n(n-1))/2}$.

2 Свойство VKZ редуцированного базиса

Пусть B – базис, полученный на вход VKZ алгоритма, а $B_{[i,j]}$ для $i < j$ базис проективной подрешетки, полученный из проекций векторов $(\mathbf{b}_i, \dots, \mathbf{b}_j)$, ортогонально векторам $\mathbf{b}_i, \dots, \mathbf{b}_j$ (иными словами, вырезанный из R -фактора квадрат на позициях с i по j). Первый вектор любого такого проективного базиса соответствует \mathbf{b}^* – i -ому вектору базиса Грамма-Шмидта (остальные вектора из этого вырезанного проективного базиса, в общем, не обязаны соответствовать векторам базиса Грама-Шмидта).

1. Примените теорему Минковского к $B_{[i,i+\beta-1]}$ и получите верхнюю границу на $\|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$. Конкретно, покажите, что

$$\|\mathbf{b}_i^*\|^\beta \leq \beta^{\beta/2} \prod_{j=i}^{i+\beta-1} \|\mathbf{b}_j^*\| \quad (1)$$

А: Теорема Минковского утверждает $\lambda_1(L) \leq \sqrt{n}(\det L)^{1/n}$ для решетки L ранга n . Для проективного блока $B_{[i,i+\beta-1]}$ эта теорема переписывается как $\lambda_1(B_{[i,i+\beta-1]}) \leq \sqrt{\beta} \det(B_{[i,i+\beta-1]})^{1/\beta} = (\prod_{j=i}^{i+\beta-1} \|\mathbf{b}_j^*\|)^{1/\beta}$. Искомое неравенство получается возведение последнего в степень β .

2. Используя неравенство выше, покажите, что для $1 \leq i \leq n - \beta + 1$'s, справедливо

$$\|\mathbf{b}_1^*\|^{\beta-1} \cdot \|\mathbf{b}_2^*\|^{\beta-2} \cdot \dots \cdot \|\mathbf{b}_{\beta-1}^*\| \leq \beta^{\frac{\beta(n-\beta+1)}{2}} \|\mathbf{b}_{n-\beta+2}^*\|^{\beta-1} \|\mathbf{b}_{n-\beta+3}^*\|^{\beta-2} \cdot \dots \cdot \|\mathbf{b}_n^*\|. \quad (2)$$

Для этого примените Неравенство (1) к $\prod_{i=1}^{n-\beta+1} \|\mathbf{b}_i^*\|^\beta$.

А: Применим Неравенство 1 к \mathbf{b}_i для $1 \leq i \leq n - \beta + 1$:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{b}_1^*\|^\beta &\leq \beta^{\beta/2} \prod_{j=1}^{\beta} \|\mathbf{b}_j^*\| \\ \|\mathbf{b}_2^*\|^\beta &\leq \beta^{\beta/2} \prod_{j=2}^{\beta+1} \|\mathbf{b}_j^*\| \\ &\dots \\ \|\mathbf{b}_{n-\beta+1}^*\|^\beta &\leq \beta^{\beta/2} \prod_{j=n-\beta+1}^n \|\mathbf{b}_j^*\| \end{aligned}$$

Рассмотрим произведение всех эти неравенства, получим:

$$\prod_{i=1}^{n-\beta+1} \|\mathbf{b}_i^*\|^\beta \leq \beta^{\frac{\beta(n-\beta+1)}{2}} \prod_{i=1}^{n-\beta+1} \prod_{j=i}^{\beta+i-1} \|\mathbf{b}_j^*\|.$$

Если проследить, с какими степенями включены в произведения с обеих сторон элементы $\|\mathbf{b}_i^*\|$, и сократить максимально возможные степени с обеих сторон, мы получим Неравенство 2.

3. Используя тот факт, что не только базис $B_{[1,\beta]}$ SVP-редуцирован (то есть его первый вектор есть кратчайший), но также и базисы $B_{[1,i]}$ при $i \leq \beta$ SVP редуцированы (подумайте, почему это верно), сделайте вывод, что:

$$\|\mathbf{b}_1^*\|^i \leq i^{i/2} \prod_{j=1}^i \|\mathbf{b}_j^*\| \quad \forall i \leq \beta \quad (3)$$

Сравните результат с Неравенством (1).

4. Перемножьте Неравенства (3) для $1 \leq i \leq \beta - 1$ и используйте Неравенство (2), чтобы получить

$$\|\mathbf{b}_1^*\|^{\frac{\beta(\beta-1)}{2}} \leq \beta^{\frac{\beta(n-1)}{2}} \cdot \|\mathbf{b}_{n-\beta+2}^*\|^{\beta-1} \|\mathbf{b}_{n-\beta+3}^*\|^{\beta-2} \cdot \dots \cdot \|\mathbf{b}_n^*\| \quad (4)$$

А: Напрямую следует из (грубого) неравенства $\prod_{i=1}^{\beta} i^{i/2} \leq \prod_{i=2}^{\beta-1} \beta^{\beta/2}$.

5. Положим, что в нашей решетке существует кратчайший вектора $\mathbf{v}_{\text{shortest}}$, чья проекция ортогонально первым $n - 1$ базисным векторам ненулевая (так как иначе, если все кратчайшие вектора ортогональны \mathbf{b}_n^* , то мы знаем, что все они лежат в подрешетке размерности не больше $n - 1$, и в таком случае мы можем убрать из базиса \mathbf{b}_n).

Из этого следует, что $\lambda_1 = \|\mathbf{v}_{\text{shortest}}\| \geq \|\mathbf{b}_i^*\|$ для $n - \beta + 2 \leq i \leq n$ (подумайте, почему). Подставив это неравенство в правую часть Неравенства (4), сделайте следующий вывод:

$$\|\mathbf{b}_1\| \leq \beta^{\frac{n-1}{\beta-1}} \lambda_1.$$